



Zaščitimo našo Močvirsko sklednico *Emys orbicularis*



Njena prisotnost je izjemno pomembna

Prisotnost močvirske sklednice v naših mokriščih je pomembna, saj pomaga nadzorovati populacije vodnih nevretenčarjev in čistiti tla vodnih teles, s tem pa pozitivno vpliva na zdravje ekosistemov, v katerih živi.



Sladkovodna želva

Za razliko od morskih, kopenske in sladkovodne vrste lahko svojo glavo potegnejo v oklep in jo obrnejo v stran.



Foto di Pina Piccardo

Veliko ima skupnega s kačami, krokodili in kuščarji




Je plazilec in ima z njimi nekaj skupnih lastnosti:

- njena **koža** je trda in luskasta,
- njena **telesna temperatura** je odvisna od temperature okolja (so eksotermne živali).



S čim se prehranjuje

Je vsejeda: rastlinojeda in mesojeda vrsta.



Komu je hrana?

Njena jajca in mladiče plenijo:

- sesalci (lisice, jazbeci in podgane)
- ptiči (vrane, šoje in galebi)
- nekatere ribe

Odrasli osebki nimajo naravnih plenilcev.



Kako se razmnožuje?

Oploditev je notranja, spolno zrelost samci dosežejo pri 3 – 7 letih, samice pa pri 6 – 10 letih.

V povprečju **pri enem leglu odležejo 3 – 11 jajc**: v tla izkopljejo gnezdo, ki ga po odlaganju jajc prekrijejo z zemljo in zapustijo. Mladiči se izležejo po približno **80 – 90 dneh**.



Avtor fotografije: Pina Piccardo

Ste vedeli, da ...

- je spol želvjih mladičev odvisen od temperature?
> 29°C izvalile se bodo samičke,
< 28°C izvalili se bodo samčki
- hrane ne more požirati brez vode?
- močvirska sklednica v povprečju živi 40–60 let, izjemoma pa lahko živi tudi 100 let?

Močvirska sklednica je v nevarnosti!

V zadnjem stoletju je populacija močvirske sklednice **močno upadla** in jo je mogoče najti le še na **manjših in razdrobljenih območjih**.

Je **zaščitena vrsta**, trgovanje z njo pa je **prepovedano**.

- Spreminjanje in izginjanje naravnih habitatov (onesnaževanje, odzemanje vode, sekanje gozdov, izsuševanje).
- **Tujerodne invazivne želve**, ki z močvirsko sklednico tekmujejo za hrano in mesta za sončenje.
- **Izguba genetske identitete** zaradi križanja osebkov različnih populacij.
- **Motenje in plenjenje** jajc, mladičev in mladih osebkov.
- **Pomanjkanje** usklajenega ukrepanja za **ohranjanje te vrste**.

Grožnje:

Tujerodnih želv ne izpuščaj v okolje!

Izpuščanje sladkovodnih želv v naravo lahko povzroči njihovo smrt in je **prepovedano z zakonom**. Če imaš doma katero izmed sladkovodnih želv in ne moreš več skrbeti zanjo, je ne izpuščaj v naravo, temveč ji najdi novega lastnika.



Avtor fotografije: Vincenzo Ferri

Pazi se teh dveh!

Okrasna gizdavka (*Trachemys scripta*) je **invazivna tujerodna vrsta** (to pomeni, da je bila vnešena v okolja, kjer je prej ni bilo) in je plazilec, ki je najpogostejše izpuščen v okolje. **Trgovanje z njimi je prepovedano**.

Obstajata dve podvrsti rodu *Trachemys*:

- **rumenovratka** (*Trachemys scripta scripta*)
- **rdečevratka** (*Trachemys scripta elegans*)



Avtor fotografije: Matteo Dal Zotto



Avtor fotografije: Vincenzo Ferri